

## بررسی فونستیک کنه‌های (Acari) انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان

ایرج درویش زاده<sup>۱\*</sup>، کریم کمالی<sup>۲</sup>

۱- گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفول

۲- گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

### چکیده

در یک بررسی فونستیکی که طی سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۷۷ روی فون کنه‌های انگور در موستان‌های صفی‌آباد خوزستان صورت گرفت، در مجموع ۳۹ گونه متعلق به ۳۷ جنس و ۲۷ خانواده جمع‌آوری و شناسایی شد. در این میان ۱۲ گونه برای فون کنه‌های ایران گزارش جدید بوده که با علامت \* مشخص گردیده‌اند. بیشترین فراوانی در کنه‌های شکارگر مربوط به گونه *Androlaelaps casalis* Berlese (Laelpidae) از کنه‌های پوسیده‌خوار مربوط به *Oppia yodai* Aoki (Oppiidae) و از کنه‌های خسارت‌زا گونه *Tenuipalpus granati* Sayed (Tenuipalpidae) تعیین گردید. گونه‌های شناسایی شده به ترتیب زیر راسسته‌ها و خانواده‌ها عبارتند از:

#### Mesostigmata

Laelpidae

*Pseudoparasitus holaspis*\* (Oudemans)

*Androlaelaps casalis* (Berlese)

*Hypoaspis aculifera* Ganestrini

Ascidae

*Protogamasellus* sp.

*Lasioseius matthyssei*\* Chant

*Lasioseius phytoseioides*\* Chant

*Gamasellodes bicolor* (Berlese)

Phytoseiidae

*Euseius obtectus*\* Khan, Chaudri & Tahir

*Proprioseiopsis* sp.

*Anthoseius rhenanus* (Oudemans)

*Amblyseius reductus*\* Wainstein

Macrochelidae

*Macrocheles scutatus*\* (Berlese)

Ameroseiidae

*Ameroseius pavidus*\* Koch

Pachylaelapidae

*Pachylaelaps karawaiewi* (Berlese)

\*نویسنده رابط، پست الکترونیکی: [Darvishzadeh100@yahoo.com](mailto:Darvishzadeh100@yahoo.com)

تاریخ دریافت مقاله (۸۷/۹/۲۳) - تاریخ پذیرش مقاله (۸۸/۱/۲۵)



Trachyuropodidae	Smarididae
<i>Oplitis conspicua</i> (Berlese)	<i>Fessonnia paillosa</i> Berlese
Uropodidae	Raphignathidae
<i>Uroobovella vinicolora</i> (Vitzthum)	<i>Raphignathus gracilis</i> (Rack)
Ologamasidae	Erythraeidae
<i>Gamasiphis hemicapillus</i> * Karg	<i>Abrolophus</i> sp.
<b>Prostigmata</b>	Tarsonemidae
Tenuipalpidae	<i>Tarsonemus</i> sp.
<i>Tenuipalpus granati</i> Sayed	Pygmephoridae
Tetranychidae	<i>Pygmephorus</i> sp.
<i>Eutetranychus orientalis</i> (Klein)	Camerobiidae
<i>Tetranychus turkestanii</i> Ugarov	<i>Neophyllobius</i> sp.
Anystidae	Scutacaridae
<i>Anystis baccarum</i> L.	<i>Scutacarus fragariae</i> Rack
Stigmaeidae	<b>Astigmata</b>
<i>Eustigmaeus spathatus</i> Ueckermann & Smith-Meyer	Acaridae
Tydeidae	<i>Tyrophagus putrescentiae</i> Schrank
<i>Tydeus</i> sp.	<i>Rhizoglyphus robini</i> Claparede
Cheyletidae	<b>Oribatida</b>
<i>Eutogenes africannus</i> * Wafa & Soliman	Euphthiracaridae
<i>Hemicheyletia bakeri</i> (Ehara)	<i>Rhysotritia clavatasexion</i> * Lions
Bdellidae	Cosmochthoniidae
<i>Neomolgus</i> sp.	<i>Cosmochthonius asiaticus</i> * Gordeeva
Cunaxidae	Oppiidae
<i>Cunaxa</i> sp.	<i>Oppia yodai</i> * Aoki

واژه‌های کلیدی: فون، کنه، انگور، صفی‌آباد، ایران

#### مقدمه

انگور (*Vitis vinifera* L. (Vitales: Vitaceae)) گیاه بومی جنوب غربی آسیا است. رقم انگور یاقوتی از حیث مرغوبیت و زمان عرضه آن به بازار در منطقه صفی‌آباد واقع در شمال خوزستان اهمیت ویژه‌ای دارد. خاک این منطقه عموماً دارای pH=۷/۵ و بافت ریز و غنی از کربنات کلسیم با خاصیت نگهداری آب می‌باشد. کنه‌ها دارای تنوع زیادی از نظر گونه، رژیم غذایی، مکان زیست و غیره می‌باشند و از این نظر تعدادی از آن‌ها از گروه آفات گیاهی، عده‌ای پوسیده‌خوار و گروهی دیگر از جمله شکارگران و انگل سایر جانداران می‌باشند. هم‌تی (۱۳۶۲) در بررسی مقدماتی بندپایان مو در خوزستان گونه‌های